

Macrolepiota procera



Classe: Basidiomiceti

Nome scientifico: *Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer

Sinonimi: *Lepiota procera* Scop. ex Fr. - *Agaricus colombinus* Bull.

Nomi volgari: Mazza di tamburo - Ombrella - Ombrellon - Bubbola maggiore

Cappello: 10-25 cm, dapprima ovoidale o quasi sferico, alla fine aperto, umbonato al centro; di colore brunastro, bruno-grigio; pellicola desquamata in larghe scaglie irregolari più scure e fibrillose. Umbone liscio, dello stesso colore delle squame.

Lamelle: numerose, fitte, irregolari; bianche o giallastre, con l'età brunastro-rossastre.

Gambo: 20-40 x 1-2 cm, lungo ed esile, cilindrico, cavo, fibroso, duro, bulboso alla base, screziato bruno. Anello vistoso, grande, tipicamente staccato e scorrevole sul gambo, bianco sopra, bruno sotto, fioccoso al margine.

Carne: poco consistente, fragile, tenera nel cappello, fibroso nel gambo, bianca, che diventa leggermente rossastra o rosata all'aria. Odore e sapore di nocciola.

Spore: bianche.

Fungo saprofito.

Si trova nei boschi e nelle radure erbose. Estate-autunno.

Commestibile