

Polyporus umbellatus



Classe: Basidiomiceti

Nome scientifico: Polyporus umbellatus Pers.: Fr.

Sinonimi: Dendropolyporus umbellatus - Boletus umbellatus -

Boletus ramosissimus - Cladomeris umbellata

Nomi comuni: Poliporo umbellato

Carpoforo: il cespo può raggiungere i 40 cm, mentre i singoli cappelli 2,5 cm, che sono abbastanza regolari, tondeggianti, prima convessi con umbone, poi piani e un po' depressi al centro; di color grigio o nocciola-giallastro, con margine lobato e ondulato.

Tubuli: corti, bianchi e decorrenti.

Pori: piccoli, bianchi, rotondi poi angolosi.

Gambo: bianco, carnoso; i gambi si dipartono dal ceppo e si biforcano più volte, diminuendo di diametro per finire nei cappelli singoli, aperti come un fiore (fino a svariate centinaia).

Carne: tenera e un po' fibrosa, bianca. L'odore è simile alla farina e il sapore è gradevole; si decompone facilmente emanando un cattivo odore.

Spore: bianche in massa.

Fungo saprofita-parassita.

Fungo non molto comune, si trova in estate-autunno sui tronchi degli alberi, sulle ceppaie e sul terreno.

Non mangiabile