

Agaricus aestivalis v. veneris



Classe: Basidiomiceti

Nome scientifico: Agaricus aestivalis var. veneris (Heim & Becker)
Wasser (1980)

Sinonimo: Psalliota aestivalis var. aestivalis F. H. Möller (1950)

Cappello: diametro fino a 12 cm, convesso, ma spianato verso il centro, bianco tendente al giallo, specialmente al tatto, decorato da minutissime fibrille sericee radiali, più chiaro al margine.

Lamelle: fitte, libere, intercalate da lamellule, all'inizio di colore bianco-grigiastre, poi grigio-rosa, infine bruno-scuro, filo lamellare biancastro.

Gambo: 5-12 x 1-1,5 cm, cilindrico, leggermente ingrossato alla base, (ma non bulboso), pieno, poi farcito, di colore grigio-rossastro all'apice sopra l'anello, sotto da liscio, biancastro, bianco-grigiastro con riflessi lilacini, base in vecchiaia ingiallente.

Anello supero, inguainante, fragile.

Carne: tenera, bianca a giallo-pallido all'aria, ocrea alla base del gambo; odore gradevole, leggermente aniseo.

Spore: ovoidi, bruno-scure in massa.

Fungo simbiote.

Cresce nei boschi di conifere (abete rosso), in primavera.

Buona commestibilità